

XXVIII.—*Note on P. Picot's 'Tables Méthodiques des Mammifères et des Oiseaux . . . de la Haute Garonne.'*

By C. DAVIES SHERBORN.

As the tract here cited appears from my observations to be very scarce\*, it may be thought advisable to reprint the diagnoses of the few new species of birds founded therein by Picot. There are no new species of mammals.

The full title of the tract reads as follows:—"Tables Méthodiques | des | Mammifères et des Oiseaux | observés | dans le Département de la | Haute-Garonne, Par Philippe Picot-Lapeyrouse, | Membre de l'Institut national, Professeur | d'Histoire naturelle à l'École centrale; | Imprimées par ordre de l'Administration du | département de la Haute-Garonne: | A l'usage des Elèves de l'École centrale. | A Toulouse, | De l'Imprimerie de Veuve Douladoure. | An vii." | [1799, 8<sup>vo</sup>. viii, 54 Pp.].

The author signs his 'Avertissement':—

PH.<sup>E</sup> PICOT.

A LAPEYROUSE, le 1.<sup>er</sup> frimaire,  
an VII de la République.

and this is here reproduced as showing his real name.

The following are the species founded by him:—

P. 10.—" \*5. L'ALIMOCH. Pic. *Encycl.* *Vultur alimoch.*  
Pyrén. Pl. iv.

" Petite espèce, ainsi que le suivant. Blanc sale . . . .  
Plumes de ailes noires . . . . Jabot proéminent . . . . Tête,  
céra et jabot couleur de safran. Pic. *Encycl.*"

---

\* Mr. Sherborn writes to the Editors as follows:—

"When compiling my 'Index Animalium' I failed in my attempts to obtain a sight of Picot's 'Tables Méthodiques.' But since the publication of the Index I have purchased a copy of the work at the Gerbe sale in Paris, while I have found another copy in private hands. It may, however, be worth while, for general ornithological purposes, to reprint the diagnoses of 7 "new species" described in it, and I hope that you will find space for this in your Journal."

P. 13.—“4. LA PIEGRIÉCHE succulente. Pic. *Lanius esculentus*. Pic. Pyrén. Pl. vi.

“Rousse par-dessus, ondée de noir et de blanc . . . .  
Le dessous blanc sale rayé de noir transversalement . . .  
Les plumes de la queue et des ailes noirâtres liserées  
de fauve . . . . Arrive au printemps, repart en au-  
tomne; prend une graisse très-délicate . . . . Habite  
dans les hautains et les oseraies.”

P. 28.—“\*6. LE TRAQUET montagnard. *Motac. pyrenaica*.  
Pic. Pyrén. Pl. xvi.

“Le plus grand de Passereaux, presque aussi gros  
qu'un Merle . . . . Bec cylindrique un peu arqué vers  
sa pointe . . . . Plumage uniforme d'un noir mal teint . . .  
Poitrine brune . . . . Queue arrondie . . . . Dix plumes  
blanches terminées de brun, et les deux du milieu  
brunes seulement jusques à leur moitié . . . . Pieds noirs.  
Picot, *Mém. de l'Académ. de Toul.* T. iv.”

P. 38.—“\*4. LE RALLO-MAROUET. *Rallus mixtus*. Pic.  
Pyrén. Pl. xx.

“Plus petit encore que le *Marouette* . . . . Oiseau mi-  
parti . . . . Composé du *Râle d'eau* et de la *Marouette* . . .  
Serait-ce un Mulet? . . . . Le bec, les jambes et les  
pieds comme dans la *Marouette* . . . . Les joues, la  
gorge, le ventre bleuâtres comme dans le *Râle d'eau*.  
Pic. *Encycl. méth.*”

P. 42.—“5. LA BARGE aux pieds rouge. *Scolopax rubripes*.  
Pic Pyrén. Pl. xxii.

“Moins forte que la *Barge commune* . . . . Le dessus  
gris cendré . . . . Le dessous blanc de neige . . . . Jambes  
et pieds rouge de cinnabre . . . . . Bec à la naissance  
courbé en en bas; à sa pointe en en haut. Pic. *Mém.  
de Stockh. Encycl. méth.*”

P. 44.—“\*6. LE HÉRON montagnard. *Ardea monticola*.  
Pic. Pyrén. Pl. xxiii.

“Le plus gros de nos *Hérons* . . . . Tête rougeâtre . . . .”

P. 45. —“Les plumes du dessus du corps brunes bordées de

rougeâtre . . . . . Gorge blanche . . . . . Cou antérieur,  
poitrine et flancs roussâtres avec des lignes noires . . . . .  
Ventre blanc . . . . . Bec mi-parti de brun et de jaune . . . . .  
Jambes jaunes ; pieds noirâtres par-dessus, jaunes en  
dessous . . . . . Le mâle a une petite huppe rougeâtre . . . . .  
Pic. *Encycl. méth.*”

P. 45.—“8. LE CRABIER gentil. *Ardea audax*. Pic. Pyrén.  
Pl. xxiv.

— CRABIER marron.	} BUFF.
— CRABIER roux.	
— GUACCO.	

“Ce trois espèces doivent être réduite à une seule . . . . .  
Ce Crabier est de la grandeur de l'*Aigrette* . . . . . Tête,  
cou, poitrine et dos jaunes . . . . . Aigrette longue et  
pendante . . . . . Ailes, queue et ventre blancs . . . . . Bec  
fort très-aigu, bleu d'azur, noir à la pointe . . . . .  
Jambes et pieds couleur de chair. Pic. *Mém. de  
Stock. et Encycl. méth.*”

The words “Pic. Pyrén.” refer to ‘Recherches sur la  
Zoologie des Pyrénées, par Philippe PICOT. Figures  
enluminées . . . . . Ouvrage inédit,’ according to his  
“Explication des Abréviations.”

### XXIX.—Note on the Genus *Certhiparus*.

By Captain F. W. HUTTON, F.R.S.

OF the three birds included in the genus *Certhiparus* in the  
‘Cat. Birds Brit. Mus.’ (vol. viii. p. 75), three different  
views have been taken by ornithologists:—

I.—Lafresnaye, in 1840, placed *C. albicillus* and *C. novæ-  
zealandiæ* in one genus and *C. ochrocephalus* in another.  
This view was followed by Gray, in the ‘Zoology of the  
Erebus and Terror’ (1848) and by Dr. Finsch in the ‘Journ.  
f. Orn.’ for 1843.

II.—In ‘The Ibis’ for 1862 Gray separated *C. albicillus*  
from *C. novæ-zealandiæ*, and included it in *Orthonyx* along